

З В І Т
про основні показники наукової діяльності
у 2-му кварталі 2026 року

Табл. 1

№ з/п	Назва кафедри	Найменування показників виконання завдання	Термін виконання завдання, виконавець	Наукові результати виконання завдання
1	2	3	4	5
1	Внутрішньої медицини №1	A clinical dilemma for treatment choice of extramedullary spinal plasmacytoma in patients with multiple myeloma: chemotherapy or surgery? A double-case clinical report	Травень Т. V. Lymanets, G. S. Maslova, Y. O. Stadnik, O. L. Havlovskiyi	1
2	Внутрішньої медицини №1	The role of S-ademetionine in the correction of dyslipidemia in patients with metabolic-associated steatotic liver disease combined with ischemic heart disease	I. M. Skrypnyk, G. S. Maslova, T. V. Lymanets, O. A. Shaposhnyk	1
3	Внутрішньої медицини №1	Оцінка частоти виникнення симптомів ураження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та їх вплив на якість життя здобувачів вищої медичної освіти	Квітень Г. С. Маслова	1
4	Внутрішньої медицини №1	Оцінка ролі тривоги і депресії у виникненні кислотозалежних захворювань	Квітень Г. С. Маслова	1
5	Внутрішньої медицини №1	Оцінка факторів ризику прогресії у пацієнтів з неходжкінськими злоякісними лімфомами	Травень Т. В. Лиманець	1
6	Внутрішньої медицини №1	Progression-free survival in patients with Non-Hodgkin lymphomas treated with chemoimmunotherapy: the real-life observational study	Квітень Т. V. Lymanets	1

7	Внутрішньої медицини №1	Paradox of dietary modulation of trimethylamine-N-oxide: heterogeneity of dietary pattern effects on TMAO levels	Травень N. P. Prykhodko, O. A. Shaposhnyk	1
8	Внутрішньої медицини №1	Impact of microbiota-friendly diets on cardiovascular risk scores and microbial composition	Квітень N. Prykhodko, O. Shaposhnyk	1
9	Внутрішньої медицини №1	Проблема доказовості та інтерпритація даних у підготовці майбутні лікарів	Квітень І. О. Пілат	1

Табл. 2

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання (стаття, патент, інформаційний лист, метод. рекомендації, нововведення), конференції (програма)	Одиниця виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
1	2	3	4	5
Дослідити сучасні молекулярні та клітинні механізми нейрозапалення, визначити роль гематоенцефалічного бар'єра й біомаркерів у розвитку неврологічних захворювань та обґрунтувати перспективні підходи до діагностики й терапевтичної корекції нейрозапальних процесів.	Стаття. A clinical dilemma for treatment choice of extramedullary spinal plasmacytoma in patients with multiple myeloma: chemotherapy or surgery? A double-case clinical report / T. V. Lymanets, G. S. Maslova, Y. O. Stadnik, I. O. Gusachenko, O. L. Havlovskyi // Ukrainian Neurosurgical Journal. – 2026. – Vol. 32, № 2. – P. 112–118.	6	Обґрунтувати значення стадійно- та контекст-залежного підходу до інтерпретації біомаркерів нейрозапалення й визначення потенційних терапевтичних мішеней.	Систематизовано сучасні дані щодо механізмів нейрозапалення, ролі клітин нейроглії, сигнальних шляхів і гематоенцефалічного бар'єра. Обґрунтовано значення стадійно-залежної оцінки нейрозапалення для інтерпретації біомаркерів та вибору персоналізованих терапевтичних стратегій.
Оцінити ефективність застосування S-	Стаття	6	Оцінити ефективність комбінованої терапії S-адеметіоніном і	Встановлено позитивний вплив комбінованої терапії S-адеметіоніном і

адеметіоніну в комбінації з розувастатином для корекції порушень ліпідного профілю у пацієнтів із МАСХП у поєднанні з ІХС та порівняти отримані результати з ефективністю монотерапії розувастатином.	The role of S-adenosylmethionine in the correction of dyslipidemia in patients with metabolic-associated steatotic liver disease combined with ischemic heart disease / I. M. Skrypnyk, E. V. Ohanisian, G. S. Maslova, T. V. Lymanets, O. A. Shaposhnyk // Український терапевтичний журнал. – 2025. – № 4. – С. 5–11.		розувастатином щодо корекції порушень ліпідного профілю у пацієнтів із метаболічно-асоційованою стеатотичною хворобою печінки в поєднанні з ішемічною хворобою серця та визначити її вплив на рівні загального холестерину, ХС-ЛПНГ і тригліцеридів.	розувастатином на показники ліпідного профілю у пацієнтів із МАСХП та ІХС, що проявлявся зниженням рівнів загального холестерину, ХС-ЛПНГ і тригліцеридів. Виявлено більш виражене зниження рівня тригліцеридів порівняно з монотерапією розувастатином.
Визначити частоту та структуру симптомів ураження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у здобувачів вищої медичної освіти й оцінити їхній вплив на якість життя.	Тези Пащенко О. Оцінка частоти виникнення симптомів ураження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та їх вплив на якість життя здобувачів вищої медичної освіти / О. Пащенко, А. Алефіренко, А. Висоцька ; наук. керівник : Г. Маслова // Матеріали 30-го ювілейного конгресу студентів та молодих	1	Встановити поширеність основних гастроінтестинальних симптомів серед здобувачів вищої медичної освіти та визначити їхній зв'язок із показниками якості життя.	Проведено анкетування 82 здобувачів освіти Полтавського державного медичного університету 1–6-го курсів із використанням опитувальників GERD-Q, оцінки характеру харчування та способу життя, а також SF-36. Сформовано дві групи порівняння за тривалістю навчання для оцінки симптомів ураження верхніх відділів ШКТ та їхнього впливу на якість життя.

	учених «Майбутнє за наукою», м. Тернопіль, 31 березня –3 квітня 2026 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2026. – С. 64.			
Визначити структуру кислотозалежних захворювань у цивільних пацієнтів і військовослужбовців та оцінити роль тривоги й депресії у їх розвитку за допомогою шкали HADS.	Тези Висоцька А. В. Оцінка ролі тривоги і депресії у виникненні кислотозалежних захворювань / А. В. Висоцька, О. Ю. Пащенко ; наук. керівник : Г. С. Маслоva // BIMCO Journal : abstract book of the Bukovinian International Medical Congress 2026, м. Чернівці, 1–3 квітня 2026 р. – Чернівці : БДМУ, 2026. – С. 94.	1	Встановити особливості структури кислотозалежних захворювань у цивільних пацієнтів і військовослужбовців та визначити поширеність клінічно значущої тривоги й депресії в обстежених групах.	Виявлено відмінності у структурі кислотозалежних захворювань: у цивільних пацієнтів частіше діагностували хронічний гастрит, а у військовослужбовців — пептичну виразку. Клінічно значущу тривогу й депресію встановлено у 73,3 % цивільних пацієнтів і 72,7 % військовослужбовців, що свідчить про високу поширеність психоемоційних порушень в обох групах.
Оцінити прогностичне значення рівнів β 2-мікроглобуліну та лактатдегідрогенази (ЛДГ) у пацієнтів із неходжкінськими злоякісними лімфомами та	Тези Черевань М. Оцінка факторів ризику прогресії у пацієнтів з неходжкінськими злоякісними лімфомами /	1	Визначити зв'язок між вихідними рівнями β 2-мікроглобуліну та ЛДГ, прогностичним індексом ІРІ й частотою прогресування неходжкінських злоякісних лімфом протягом трирічного спостереження	Встановлено статистично значущий зв'язок підвищеного рівня ЛДГ із ризиком прогресування неходжкінських злоякісних лімфом. Підтверджено прогностичне значення індексу ІРІ: прогресування захворювання протягом трирічного спостереження частіше реєстрували у пацієнтів групи високого та проміжного

визначити їхній зв'язок із ризиком прогресування захворювання з урахуванням міжнародного прогностичного індексу IPI.	М. Черевань ; наук. керівник : Т. В. Лиманець // BIMCO Journal : abstract book of the Bukovinian International Medical Congress 2026, м. Чернівці, 1–3 квітня 2026 р. – Чернівці : БДМУ, 2026. – С. 106.			високого ризику. Визначено додаткові несприятливі прогностичні чинники: вік понад 60 років, III–IV стадія захворювання та ECOG ≥ 2 .
Оцінити результати хіміоімунотерапії у пацієнтів із неходжкінськими лімфомами в реальній клінічній практиці та визначити прогностичне значення індексу IPI щодо виживаності без прогресування захворювання.	Тези Cherevan M. Progression-free survival in patients with Non-Hodgkin lymphomas treated with chemoimmunotherapy: the real-life observational study / М. Cherevan, Т. Lymanets // Abstract book of the 34th International Medical Students' Conference, 23-25 April, 2026. – Cracow, Poland, 2026. – P. 329.	1	Визначити тривалість виживаності без прогресування та трирічну виживаність без прогресування у пацієнтів із неходжкінськими лімфомами залежно від прогностичного ризику за індексом IPI.	Встановлено, що трирічна виживаність без прогресування у пацієнтів із низьким і проміжним низьким ризиком за IPI становила 92%, а у пацієнтів із високим і проміжним високим ризиком — 39% (p = 0,0378). Медіана виживаності без прогресування в групі низького ризику не була досягнута, тоді як у групі високого ризику становила 27,6 місяця. Підтверджено прогностичне значення індексу IPI для оцінки результатів хіміоімунотерапії.
Порівняти ефективність різних моделей харчування щодо впливу на рівень триметиламін-N-оксиду (ТМАО) у плазмі крові	Тези Mansi. Paradox of dietary modulation of trimethylamine-N-oxide:	1	Визначити вплив рослинного, середземноморського раціону, дієти DASH та обмеження споживання червоного м'яса на рівень ТМАО, оцінити прихильність до дієтичних	Встановлено, що рослинний тип харчування найбільшою мірою сприяє зниженню рівня ТМАО, тоді як середземноморська дієта демонструє менш виражений вплив, зокрема через надходження ТМАО з морепродуктами.

та визначити чинники, що зумовлюють відмінності результатів дієтичних втручань.	heterogeneity of dietary pattern effects on TMAO levels (systematic review and meta-analysis) / Mansi ; scientific supervisors : N. P. Prykhodko, O. A. Shaposhnyk // Збірник тез доповідей 86 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2026», м. Запоріжжя, 14–15 травня 2026 р. – Запоріжжя : ЗДМФУ, 2026. – С. 53.		протоколів і чинники гетерогенності отриманих результатів.	Обґрунтовано необхідність індивідуалізації дієтичних рекомендацій з урахуванням рівня ТМАО, загальних кардіопротекторних властивостей раціону та особливостей метаболізму ТМАО.
Оцінити вплив дієтичних моделей, сприятливих для кишкової мікробіоти, на показники серцево-судинного ризику та склад кишкової мікробіоти на основі систематичного огляду й метааналізу сучасних досліджень.	Тези Mansi. Impact of microbiota-friendly diets on cardiovascular risk scores and microbial composition / Mansi ; scientific advisors : N. Prykhodko, O. Shaposhnyk // BIMCO Journal : abstract book of	1	Визначити зв'язок між дотриманням мікробіото-орієнтованих моделей харчування, змінами серцево-судинного ризику та характеристиками кишкової мікробіоти.	Встановлено, що мікробіото-орієнтовані моделі харчування сприяють зниженню сумарного серцево-судинного ризику (SMD $-0,36$; $p < 0,001$), рівнів загального холестерину, ХС-ЛПНЩ, систолічного артеріального тиску та високочутливого С-реактивного білка. Виявлено збільшення α -різноманіття кишкової мікробіоти, зростання відносної кількості Bifidobacterium і Faecalibacterium prausnitzii та зменшення кількості

	the Bukovinian International Medical Congress 2026, м. Чернівці, 1–3 квітня 2026 р. – Чернівці : БДМУ, 2026. – С. 81.			представників родини Enterobacteriaceae. Отримані результати обґрунтовують перспективність дієтичної корекції кишкової мікробіоти для профілактики серцево-судинних захворювань.
--	---	--	--	--

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1
доцент, д. мед. н.

Ганна МАСЛОВА

Відповідальна за НДР кафедри
доцент, к. мед. н.
0507699151

Наталія ПРИХОДЬКО