

У пацієнтки віком 18 років після укусу бджоли спостерігається: набряк губи, обличчя, шиї, відчуття жару та задишка. Дихання утруднене, шумне, кашель. Шкіра бліда, холодна на дотик. АТ - 75/50 мм рт. ст. Пульс ниткоподібний - 98/хв. Тахікардія, тони серця глухі, ритмічні. Який найімовірніший діагноз?

- a. Астматичний статус
- b. Анафілактичний шок
- c. Кропив'янка
- d. Набряк Квінке
- e. Гіпотонічний криз

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

У пацієнтки віком 26 років після вживання полуниці з'явилися набряк обличчя, особливо носу та губ, хриплість голосу. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка неспокійна, ціаноз шкіри обличчя, уртикарний висип на шиї та грудній клітці. Який найімовірніший діагноз?

- a. Серцева астма
- b. Кропив'янка
- c. Анафілактичний шок
- d. Набряк Квінке
- e. Напад бронхіальної астми

Коментар

Правильна відповідь: Набряк Квінке

У хворого 24-х років, який перебував на лікуванні з приводу менінгококцемії, погіршився загальний стан. Об'єктивно: акроціаноз, кінцівки холодні, ЧД- 30/хв., ЧСС- 140/хв., АТ- 40/0 мм рт.ст., анурія. Який невідкладний стан розвинувся?

- a. Гіповолемічний шок
- b. Септичний шок
- c. Тромбоз легеневої артерії
- d. Анафілактичний шок
- e. Гемолітико-уремічний синдром

Коментар

Правильна відповідь: Септичний шок

Жінці віком 35 років через пневмонію призначено ампіцилін. За 30 хвилин після внутрішньом'язової ін'єкції препарату пацієнтка відчула різку слабкість, з'явився кашель, задишка, біль у грудні клітці. Об'єктивно спостерігається: ціаноз, набряк повік, обличчя з червоним висипом. Пульс - 120/хв, АТ - 70/20 мм рт. ст. Тони серця глухі, дихання часте, поверхневе, з різнокаліберними вологими хрипами. Варикозне розширення вен на правій голі. Яка найімовірніша причина раптового погіршення стану жінки?

- a. Астматичний напад
- b. набряк Квінке
- c. Анафілактичний шок
- d. Тромбоемболія легеневої артерії
- e. Кропив'янка

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

Пацієнт віком 19 років скаржиться на утруднене дихання, явища риніту та набряк повік. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися на 7-й день після початку лікування пневмонії, має поліноз. Об'єктивно спостерігається: почервоніння та набряк повік, набряк м'якого піднебіння, язичка та піднебінних мигдаликів. Аускультативно в легенях вислуховується: поодинокі дрібноміхурцеві вологі хрипи. Який найімовірніший діагноз?

- a. набряк Квінке
- b. Багатоформна ексудативна еритема
- c. Алергічний кон'юнктивіт
- d. Загострення полінозу
- e. Бронхіальна астма

Коментар

Правильна відповідь: набряк Квінке

Пацієнта віком 60 років шпиталізовано до відділення реанімації з діагнозом: гострий Q-позитивний інфаркт міокарда. На другу добу перебування в стаціонарі стан пацієнта значно погіршився. Скарги на задишку. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, волога, холодна на дотик. Аускультативно над легенями дихання везикулярне, послаблене, ЧД - 25/хв. ЧСС - 110/хв. Тони серця глухі, ритм галопу, АТ - 80/40 мм рт. ст., сечовиділення - 10 мл/год. Яке ускладнення інфаркту міокарда виникло в пацієнта?

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Кардіогенний шок*
- c. Синдром Дресслера
- d. Серцева астма
- e. Тромбоендокардит

У пацієнтки віком 23 роки на прийомі у стоматолога через 3 хв після введення лідокаїну розвинулася різка задишка, запаморочення, стиснення в грудній клітці. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, АТ - 70/30 мм рт. ст., пульс - 108/хв, ниткоподібний. Аускультативно дихання в легенях жорстке везикулярне, маса дифузних сухих свистячих хрипів, вислуховуються дистанційні хрипи. Який лікарський засіб необхідно ввести першочергово для надання невідкладної допомоги?

- a. Адреналін*
- b. Еуфілін
- c. Сальбутамол
- d. Морфін
- e. Преднізолон

Чоловік 43-х років скаржиться на появу набряку обличчя, задухи та утрудненого ковтання через 3 години після укусу комах. Об'єктивно: шкіра повік, щік та губ різко гіперемована й набрякла. Які засоби невідкладної допомоги слід призначити хворому?

- a. Міорелаксанти
- b. Діуретики
- c. Глюкокортикостероїди
- d. Антигістамінні
- e. Нестероїдні протизапальні

Коментар

Правильна відповідь: Глюкокортикостероїди

Чоловік 31-го року доставлений до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на утруднене дихання, відчуття стороннього тіла в горлі, осиплість, сильний набряк обличчя та шиї. Вищевказані симптоми швидко нарастають та з'явилися протягом декількох хвилин після куштування меду. Який стан найбільш імовірно розвинувся у хворого?

- a. Токсичний епідермальний некроліз
- b. Гострий ларинготрахеїт
- c. Синдром Стівенса-Джонсона
- d. Ангіоневротичний набряк Квінке
- e. Запальний набряк гортані

Коментар

Правильна відповідь: Ангіоневротичний набряк Квінке

У хворого 47-ми років на восьмий день після операції з приводу панкреонекрозу, перитоніту з'явилося підвищення температури тіла до 39°C, анемія, лейкоцитоз, гіпопротеїнемія, спленомегалія, токсична енцефалопатія. Яке ускладнення має розвиток у цій ситуації?

- a. Загальна гнійна інфекція (сепсис)
- b. Гостра ниркова недостатність
- c. Гострий менінгіт
- d. Внутрішньоочеревинна кровотеча
- e. Гостра печінкова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Загальна гнійна інфекція (сепсис)

У жінки віком 35 років за 30 хвилин після внутрішньо-м'язової ін'єкції ампіциліну виникли різка слабкість, свербіж обличчя та рук, нудота, кашель, задишка, біль у грудній клітці. Об'єктивно спостерігається: ціаноз, набряк повік, обличчя, шиї, шкіра волога з червоним висипом. Пульс - 120/хв, АТ - 70/20 мм рт. ст., тони серця глухі, дихання часте, поверхневе з великою кількістю різнокаліберних вологих хрипів. З введення якого препарату необхідно негайно розпочати терапію?

- a. Еуфіліну
- b. Преднізолону
- c. Астмопенту
- d. Адреналіну
- e. Допаміну

Коментар

Правильна відповідь: Адреналіну

У хворого 24-х років, який перебував на лікуванні з приводу менінгококцемії, погіршився загальний стан. Об'єктивно: акроціаноз, кінцівки холодні, ЧД- 30/хв., ЧСС- 140/хв., АТ- 40/0 мм рт.ст., анурія. Який невідкладний стан розвинувся?

Питання 8 Відповідь

- a. Гемолітико-уремічний синдром
- b. Тромбоз легеневої артерії
- c. Анафілактичний шок
- d. Септичний шок*

е.Гіповолемічний шок

У постраждалого в стані травматичного шоку після значної крововтрати, артеріальний тиск - 70 мм рт. ст., ЧСС - 140/хв. Під час гіповолемічного шоку:

Питання 40 Відповідь

- а.Знижується системний судинний опір
- б.Виникають набряки на нижніх кінцівках
- с.Збільшується центральний венозний тиск
- д.Знижується серцевий індекс*
- е.Підвищується рН плазми

Пацієнта віком 60 років шпиталізовано до відділення реанімації з діагнозом: гострий Q-позитивний інфаркт міокарда. На другу добу перебування в стаціонарі стан пацієнта значно погіршився. Скарги на задишку. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, волога, холодна на дотик. Аускультативно над легенями дихання везикулярне, послаблене, ЧД - 25/хв. ЧСС - 110/хв. Тони серця глухі, ритм галопу, АТ - 80/40 мм рт. ст., сечовиділення - 10 мл/год. Яке ускладнення інфаркту міокарда виникло в пацієнта?

Питання 47 Відповідь

- а.Серцева астма
- б.Тромбоемболія легеневої артерії
- с.Синдром Дресслера
- д.Тромбоендокардит
- е.Кардіогенний шок*

У пацієнта віком 46 років після провідникової анестезії виникла різка слабкість, неспокій, біль у грудях, задишка, блювання. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, холодний піт. Пульс - 120/хв, ритмічний, ниткоподібний. АТ - 70/40 мм рт. ст. Аускультативно - тони серця часті, глухі. У легенях вислуховується жорстке дихання з подовженим видихом, розсіяні свистячі хрипи. Живіт здутий, чутливий під час пальпації. Який лікарський засіб необхідно призначити першочергово?

Нітрогліцерин

Адреналін*

Еуфілін

Урапідил

Дексаметазон