

ШОКИ

У пацієнтки віком 18 років після укусу бджоли спостерігається: набряк губи, обличчя, шиї, відчуття жару та задишка. Дихання утруднене, шумне, кашель. Шкіра бліда, холодна на дотик. АТ - 75/50 мм рт. ст. Пульс ниткоподібний - 98/хв. Тахікардія, тони серця глухі, ритмічні. Який найімовірніший діагноз?

Варіанти відповідей

а.Гіпотонічний криз

б.Набряк Квінке

с.Кропив'янка

д.Анафілактичний шок

е.Астматичний статус

Ключові слова

після укусу бджоли спостерігається: набряк губи

Правильна відповідь

Анафілактичний шок

У пацієнтки віком 26 років після вживання полуниці з'явилися набряк обличчя, особливо носу та губ, охриплість голосу. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка неспокійна, ціаноз шкіри обличчя, уртикарний висип на шиї та грудній клітці. Який найімовірніший діагноз?

Варіанти відповідей

а.Серцева астма

б.Кропив'янка

с.Анафілактичний шок

д.Набряк Квінке

е.Напад бронхіальної астми

Ключові слова

з'явилися набряк обличчя, особливо носу та губ, охриплість голосу

Правильна відповідь

Правильна відповідь: набряк Квінке

У хворого 24-х років, який перебував на лікуванні з приводу менінгококцемії, погіршився загальний стан. Об'єктивно: акроціаноз, кінцівки холодні, ЧД- 30/хв., ЧСС- 140/хв., АТ- 40/0 мм рт.ст., анурія. Який невідкладний стан розвинувся?

Варіанти відповідей

- a. Гіповолемічний шок
- b. Септичний шок
- c. Тромбоз легеневої артерії
- d. Анафілактичний шок
- e. Гемолітико-уремічний синдром

Ключові слова

лікуванні з приводу менінгококцемії

Правильна відповідь

Правильна відповідь: Септичний шок

Жінці віком 35 років через пневмонію призначено ампіцилін. За 30 хвилин після внутрішньом'язової ін'єкції препарату пацієнтка відчула різку слабкість, з'явився кашель, задишка, біль у грудні клітці. Об'єктивно спостерігається: ціаноз, набряк повік, обличчя з червоним висипом. Пульс - 120/хв, АТ - 70/20 мм рт. ст. Тони серця глухі, дихання часте, поверхнєве, з різнокаліберними вологими хрипами. Варикозне розширення вен на правій гомілці. Яка найімовірніша причина раптового погіршення стану жінки?

Варіанти відповідей

- а.Астматичний напад
- б.Набряк Квінке
- с.Анафілактичний шок
- д.Тромбоемболія легеневої артерії
- е.Кропив'янка

Ключові слова

За 30 хвилин після внутрішньом'язової ін'єкції препарату пацієнтка відчула різку слабкість, з'явився кашель, задишка, біль у грудні клітці

набряк повік, обличчя з червоним висипом

Правильна відповідь

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

Пацієнт віком 19 років скаржиться на утруднене дихання, явища риніту та набряк повік. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися на 7-й день після початку лікування пневмонії, має поліноз. Об'єктивно спостерігається: почервоніння та набряк повік, набряк м'якого піднебіння, язичка та піднебінних мигдаликів. Аускультативно в легенях вислуховується: поодинокі дрібноміхурцеві вологі хрипи. Який найімовірніший діагноз?

Варіанти відповідей

- a. набряк Квінке
- b. Багатоформна ексудативна еритема
- c. Алергічний кон'юнктивіт
- d. Загострення полінозу
- e. Бронхіальна астма

Ключові слова

на 7-й день після початку лікування пневмонії, має поліноз. Об'єктивно спостерігається: почервоніння та набряк повік, набряк м'якого піднебіння, язичка та піднебінних мигдаликів

Правильна відповідь

Правильна відповідь: набряк Квінке

Пацієнта віком 60 років шпиталізовано до відділення реанімації з діагнозом: гострий Q-позитивний інфаркт міокарда. На другу добу перебування в стаціонарі стан пацієнта значно погіршився. Скарги на задишку. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, волога, холодна на дотик. Аускультативно над легенями дихання везикулярне, послаблене, ЧД - 25/хв. ЧСС - 110/хв. Тони серця глухі, ритм галопу, АТ - 80/40 мм рт. ст., сечовиділення - 10 мл/год. Яке ускладнення інфаркту міокарда виникло в пацієнта?

Варіанти відповідей

a.Тромбоемболія легеневої артерії

b.Кардіогенний шок

c.Синдром Дресслера

d.Серцева астма

e.Тромбоендокардит

Ключові слова

гострий Q-позитивний інфаркт міокарда. На другу добу перебування в стаціонарі стан пацієнта значно погіршився

тони серця глухі, ритм галопу, АТ - 80/40 мм рт. ст., сечовиділення - 10 мл/год

Правильна відповідь

b. Кардіогенний шок

У пацієнтки віком 23 роки на прийомі у стоматолога через 3 хв після введення лідокаїну розвинулася різка задишка, запаморочення, стиснення в грудній клітці. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, АТ - 70/30 мм рт. ст., пульс - 108/хв, ниткоподібний. Аускультативно дихання в легенях жорстке везикулярне, маса дифузних сухих свистячих хрипів, вислуховуються дистанційні хрипи. Який лікарський засіб необхідно ввести першочергово для надання невідкладної допомоги?

Варіанти відповідей

a.Адреналін

b.Еуфілін

c.Сальбутамол

d.Морфін

e.Преднізолон

Ключові слова

. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, АТ - 70/30 мм рт. ст., пульс - 108/хв

Правильна відповідь

а.Адреналін

Чоловік 43-х років скаржиться на появу набряку обличчя, задухи та утрудненого ковтання через 3 години після укусу комах. Об'єктивно: шкіра повік, щік та губ різко гіперемована й набрякла. Які засоби невідкладної допомоги слід призначити хворому?

Варіанти відповідей

a. Міорелаксанти

b. Діуретики

c. Глюкокортикостероїди

d. Антигістамінні

e. Нестероїдні протизапальні

Ключові слова

набряку обличчя, задухи та утрудненого ковтання через 3 години після укусу комахи

Правильна відповідь

Правильна відповідь: Глюкокортикостероїди

Чоловік 31-го року доставлений до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на утруднене дихання, відчуття стороннього тіла в горлі, осиплість, сильний набряк обличчя та шиї. Вищевказані симптоми швидко нарастають та з'явилися протягом декількох хвилин після куштування меду. Який стан найбільш імовірно розвинувся у хворого?

Варіанти відповідей

a.Токсичний епідермальний некроліз

b.Гострий ларинготрахеїт

c.Синдром Стівенса-Джонсона

d.Ангіоневротичний набряк Квінке

e.Запальний набряк гортані

Ключові слова

відчуття стороннього тіла в горлі, осиплість, сильний набряк обличчя
після куштування меду

Правильна відповідь

Правильна відповідь: Ангіоневротичний набряк Квінке

У хворого 47-ми років на восьмий день після операції з приводу панкреонекрозу, перитоніту з'явилося підвищення температури тіла до 39°C , анемія, лейкоцитоз, гіпопротеїнемія, спленомегалія, токсична енцефалопатія. Яке ускладнення має розвиток у цій ситуації?

Варіанти відповідей

a. Загальна гнійна інфекція (сепсис)

b. Гостра ниркова недостатність

c. Гострий менінгіт

d. Внутрішньоочеревинна кровотеча

e. Гостра печінкова недостатність

Ключові слова

день після операції

з'явилося підвищення температури тіла до 39°C ,

Правильна відповідь

Правильна відповідь: Загальна гнійна інфекція (сепсис)

У жінки віком 35 років за 30 хвилин після внутрішньо-м'язової ін'єкції ампіциліну виникли різка слабкість, свербіж обличчя та рук, нудота, кашель, задишка, біль у грудній клітці. Об'єктивно спостерігається: ціаноз, набряк повік, обличчя, шиї, шкіра волога з червоним висипом. Пульс - 120/хв, АТ - 70/20 мм рт. ст., тони серця глухі, дихання часте, поверхнєве з великою кількістю різнокаліберних вологих хрипів. З введення якого препарату необхідно негайно розпочати терапію?

Варіанти відповідей

a.Еуфіліну

b.Преднізолону

c.Астмопенту

d.Адреналіну

e.Допаміну

Ключові слова

Пульс - 120/хв, АТ - 70/20 мм рт. ст.

Правильна відповідь

Правильна відповідь: Адреналіну

У хворого 24-х років, який перебував на лікуванні з приводу менінгококцемії, погіршився загальний стан. Об'єктивно: акроціаноз, кінцівки холодні, ЧД- 30/хв., ЧСС- 140/хв., АТ- 40/0 мм рт.ст., анурія. Який невідкладний стан розвинувся?

Варіанти відповідей

a. Гемолітико-уремічний синдром

b. Тромбоз легеневої артерії

c. Анафілактичний шок

d. Септичний шок

e. Гіповолемічний шок

Ключові слова

на лікуванні з приводу менінгококцемії

ЧСС- 140/хв., АТ- 40/0

Правильна відповідь

d.Септичний шок

У постраждалого в стані травматичного шоку після значної крововтрати, артеріальний тиск - 70 мм рт. ст., ЧСС - 140/хв. Під час гіповолемічного шоку:

Варіанти відповідей

- a. Знижується системний судинний опір
- b. Виникають набряки на нижніх кінцівках
- c. Збільшується центральний венозний тиск
- d. Знижується серцевий індекс
- e. Підвищується рН плазми

Ключові слова

артеріальний тиск - 70 мм рт. ст., ЧСС - 140/хв.

Правильна відповідь

d. Знижується серцевий індекс

Пацієнта віком 60 років шпиталізовано до відділення реанімації з діагнозом: гострий Q-позитивний інфаркт міокарда. На другу добу перебування в стаціонарі стан пацієнта значно погіршився. Скарги на задишку. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, волога, холодна на дотик. Аускультативно над легенями дихання везикулярне, послаблене, ЧД - 25/хв. ЧСС - 110/хв. Тони серця глухі, ритм галопу, АТ - 80/40 мм рт. ст., сечовиділення - 10 мл/год. Яке ускладнення інфаркту міокарда виникло в пацієнта?

Варіанти відповідей

- a. Серцева астма
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Синдром Дресслера
- d. Тромбоендокардит
- e. Кардіогенний шок

Ключові слова

гострий Q-позитивний інфаркт міокарда. На другу добу перебування в стаціонарі стан пацієнта значно погіршився

ЧСС - 110/хв. Тони серця глухі, ритм галопу, АТ - 80/40 мм рт. ст.,

Правильна відповідь

е.Кардіогенний шок

У пацієнта віком 46 років після провідникової анестезії виникла різка слабкість, неспокій, біль у грудях, задишка, блювання. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, холодний піт. Пульс - 120/хв, ритмічний, ниткоподібний. АТ - 70/40 мм рт. ст. Аускультативно - тони серця часті, глухі. У легенях вислуховується жорстке дихання з подовженим видихом, розсіяні свистячі хрипи. Живіт здутий, чутливий під час пальпації. Який лікарський засіб необхідно призначити першочергово?

Варіанти відповідей

Нітрогліцерин

Адреналін*

Еуфілін

Урапідил

Дексаметазон

Ключові слова

Пульс - 120/хв, ритмічний, ниткоподібний. АТ - 70/40 мм р

Правильна відповідь

Адреналін*