

**Тема: „Ведення хворого з
хронічним (що повторюється)
болем в грудній клітці“**

1. Протягом останніх трьох місяців пацієнтку віком 68 років турбує біль у серці тривалістю 10 хвилин, що виникає при найменшому фізичному навантаженні. Нітрогліцерином не користується через сильний головний біль. Неодноразово лікувалася з приводу ІХС, перенесла інфаркт міокарда. АТ періодично підвищується до 160/80 мм рт. ст. На ЕКГ спостерігаються рубцеві зміни ділянки задньої стінки лівого шлуночка. Аускультативно виявлено систолічний шум над аортою. Який діагноз найімовірніший?

Варіанти відповідей

- a. Нестабільна стенокардія
- b. Рецидивний інфаркт міокарда
- c. Стабільна стенокардія напруги ФК IV
- d. Аневризма аорти з розшаруванням
- e. Стабільна стенокардія напруги ФК II

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ **біль у серці тривалістю 10 хвилин, що виникає при найменшому фізичному навантаженні**
- ✓ **неодноразово лікувалася з приводу ІХС, перенесла інфаркт міокарда**

Правильна відповідь

Стабільна стенокардія напруги ФК IV

2. Пацієнт віком 48 років скаржиться на частий стискальний біль за грудиною з іррадіацією в ліве плече і ліву лопатку. Напади виникають вночі, у повному спокої, тривають 10-15 хв. Змін загального стану та порушень на ЕКГ під час звертання до поліклініки не виявлено. Яке обстеження є найнеобхіднішим для уточнення діагнозу?

Варіанти відповідей

- a. Холтерівське моніторування ЕКГ
- b. Велоергометрія
- c. Катетеризація порожнини серця
- d. Повторна ЕКГ через тиждень
- e. Ехокардіографія

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ змін загального стану та порушень на ЕКГ не виявлено
- ✓ частий стискальний біль за грудиною з іррадіацією в ліве плече і ліву лопатку

Правильна відповідь

Холтерівське моніторування ЕКГ

3. Чоловік 61 року звернувся до дільничного лікаря зі скаргами на напади стиснення за грудиною, які виникають під час ходьби до 200 м та зникають, якщо зупинитися. Уважає себе хворим близько року. Межі серця в нормі, тони помірно приглушені, ЧСС=Ps=76/хв., АТ - 130/80 мм рт. ст. Який найбільш імовірний діагноз у хворого?

Варіанти відповідей

- а.Тривожний розлад
- б.ІХС: Нестабільна стенокардія
- с.Хронічне обструктивне захворювання легень
- д.ІХС: Стабільна стенокардія
- е.ІХС: Інфаркт міокарда без елевації сегменту ST

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ **напади стиснення за грудиною, які виникають під час ходьби до 200 м**
- ✓ **зникають, якщо зупинитися**

Правильна відповідь

ІХС: Стабільна стенокардія

4. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, підвищення температури тіла до $37,8^{\circ}\text{C}$, тупий біль у ділянці серця, серцебиття. Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому хворіла на ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пульс - 95/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст. Аускультативно дихання везикулярне, ЧД - 22/хв. Тони серця ритмічні, І тон на верхівці послаблений, вислуховується систолічний шум. На ЕКГ спостерігається: вольтаж знижений, зубець Т - негативний. За результатами лабораторних досліджень виявлено: підвищений рівень АСТ, ЛДГ, КФК. Який найімовірніший діагноз?

Варіанти відповідей

- а.Ексудативний плеврит
- б.Інфекційний ендокардит
- с.Вірусний міокардит
- д.Гострий перикардит
- е.Гострий інфаркт міокарда

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ підвищення температури тіла до 37,8°C
- ✓ 2 тижні тому хворіла на ГРВІ
- ✓ на ЕКГ: вольтаж знижений, зубець Т- негативний

Правильна відповідь

Вірусний міокардит

5. До лікаря звернувся чоловік 36-ти років зі скаргами на пекучий за грудинний біль, що зазвичай виникає через 1-1,5 години після вживання їжі. Зазначає, що біль підсилюється в горизонтальному положенні. При верхній ендоскопії виявлені 2 вогнищевих ураження нижньої третини слизової оболонки стравоходу до 5 мм в межах однієї складки. Яка тактика лікаря буде найбільш доречною?

Варіанти відповідей

- a. Призначення кларитроміцину
- b. Призначення ненаркотичних анальгетиків
- c. Хірургічне лікування
- d. -
- e. Призначення інгібіторів протонної помпи

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ **пекучий за грудинний біль, що виникає через 1-1,5 години після вживання їжі**
- ✓ **біль підсилюється в горизонтальному положенні**
- ✓ **при верхній ендоскопії виявлені 2 вогнищевих ураження нижньої третини слизової оболонки стравоходу**

Правильна відповідь

Призначення інгібіторів протонної помпи

6. Пацієнт віком 45 років скаржиться на затримку проходження їжі, відчуття розпирання за грудниною, блювання неперетравленою їжею. Під час штучного контрастування стравоходу барієвою сумішшю виявлено стійке конусоподібне звуження над-, піддіафрагмального, діафрагмального сегментів стравоходу з чіткими, рівними контурами. Вище вздовж усіх інших сегментів спостерігається різке дифузне розширення стравоходу, а також його подовження з утворенням вигинів. Газовий міхур шлунка відсутній. Який найімовірніший діагноз?

Варіанти відповідей

а.Хвороба Гіршпрунга

б.Езофагіт

с.Рак стравоходу

д.Перфорація стравоходу

е.Ахалазія кардіальної частини шлунка

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ скаржитися на затримку проходження їжі, відчуття розпирання за грудниною, блювання неперетравленою їжею
- ✓ виявлено стійке конусоподібне звуження над-, піддіафрагмального, діафрагмального сегментів стравоходу
- ✓ вище спостерігається різке дифузне розширення стравоходу

Правильна відповідь

Ахалазія кардіальної частини шлунка

7. До лікаря в ОКЛ звернулась жінка 35 років зі скаргами на біль за грудиною, утруднення проходження твердої та рідкої їжі стравоходом, підвищену слинотечу, зригування їжі, схуднення. Такі симптоми турбують близько року після перенесеного психоемоційного стресу. Який попередній діагноз?

Варіанти відповідей

а. Дивертикул стравоходу

б. Післяопіковий рубцевий стеноз

с. Ахалазія стравоходу

д. Рак стравоходу

е. Атрезія стравоходу

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ **біль за грудиною, утруднення проходження твердої та рідкої їжі стравоходом, підвищену слинотечу, зригування їжі**
- ✓ **після перенесеного психоемоційного стресу**

Правильна відповідь

Ахалазія стравоходу

8. Хворий 36-ти років скаржиться на виражену задишку, біль у ділянці серця. Своє захворювання пов'язує з перенесеним 2 тижні тому грипом. Об'єктивно: сидить, нахилившись уперед. Обличчя набрякле, ціанотичне, також спостерігається набряк шийних вен. Межі серця розширені у обидві сторони, тони глухі, частота серцевих скорочень=пульс - 118/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. У крові: швидкість осідання еритроцитів - 46 мм/год. На ЕКГ - низький вольтаж. На рентгенограмі - трапецієподібна тінь серця, ознаки застою у легенях. Яка лікувальна тактика?

Варіанти відповідей

- a. Призначення антибіотиків
- b. Проведення пункції перикарда
- c. Призначення сечогінних
- d. Проведення перикардектомії
- e. Призначення глюкокортикостероїдів

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ скаржиться на виражену задишку, пов'язує з перенесеним 2 тижні тому грипом
- ✓ обличчя набрякле, ціанотичне, набряк шийних вен
- ✓ рентгенограмі - трапецієподібна тінь серця

Правильна відповідь

Проведення пункції перикарда

9. Чоловік 60 років під час надходження до лікарні скаржиться на відчуття розпирання за грудиною, яке з'являється під час швидкого ходіння та фізичного навантаження. Біль триває приблизно 5 хвилин і минає самостійно в стані спокою. Об'єктивно спостерігається: пульс - 75/хв, АТ - 140/80 мм рт.ст. Межі серця без змін. Тони серця дещо ослаблені, ритмічні, чисті. На ЕКГ змін не виявлено. Який попередній діагноз?

Варіанти відповідей

a. Вегетосудинна дистонія

b. Варіантна стенокардія

c. Стенокардія напруги

d. Міозит

e. Міжреберна невралгія

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ **відчуття розпирання за грудиною під час фізичного навантаження**
- ✓ **біль триває приблизно 5 хвилин і минає самотійно в стані спокою**

Правильна відповідь

Стенокардія напруги

10. У чоловіка о 5-й годині ранку стався напад сильного болю за грудиною, що супроводжувався кволістю та холодним потом. На ЕКГ виявлено: куполоподібний підйом сегмента ST у відведеннях II, III, aVF, V5-V6. Після вщухання болю показники ЕКГ повернулися до норми. Який імовірний діагноз?

Варіанти відповідей

- a. Дилатаційна кардіоміопатія
- b. Гострий інфаркт міокарда в задньобочковій ділянці лівого шлуночка
- c. Спонтанна стенокардія типу Prinzmetal
- d. Перикардит
- e. Міокардит

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ о 5-й годині ранку напад сильного болю за грудиною
- ✓ на ЕКГ куполоподібний підйом сегмента ST
- ✓ після вщухання болю показники ЕКГ повернулися до норми

Правильна відповідь

Спонтанна стенокардія типу Prinzmetal

11. Чоловік 38 років скаржиться на періодичне утруднення ковтання як твердої, так і рідкої їжі протягом багатьох місяців. Іноді виникає сильний біль за грудниною, особливо після гарячого пиття. Відзначаються напади задухи в нічний час. Вагу не втрачав. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, шкірні покриви звичайного забарвлення. У шлунково-кишковому тракті змін під час огляду не виявлено. На рентгенограмі органів грудної клітки - розширення стравоходу з рівнем рідини в ньому. Поставте діагноз.

Варіанти відповідей

а.Рак стравоходу

б.Гастро-езофагальна рефлюксна хвороба

с.Ахалазія стравоходу

д.Кандидоз стравоходу

е.Міастенія

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ **утруднення ковтання як твердої, так і рідкої їжі**
- ✓ **сильний біль за грудниною, особливо після гарячого пиття**
- ✓ **на рентгенограмі органів грудної клітки - розширення стравоходу з рівнем рідини в ньому**

Правильна відповідь

Ахалазія стравоходу

12. Дівчинка 8 років після хвороби на гостру респіраторну інфекцію впродовж останніх 2 тижнів скаржиться на біль у ділянці серця, відчуття серцебиття. Об'єктивно спостерігається: фебрильна температура тіла, блідість шкірних покривів, розширення меж серця вліво, ЧСС - 142/хв., парні передсердні екстрасистоли, глухість серцевих тонів, неінтенсивний систолічний шум, максимальний у 5-й точці. Який попередній діагноз?

Варіанти відповідей

а. Міокардит

б. Вроджена вада серця

с. Функціональні зміни в серці

д. Вегетативна дисфункція

е. Ендокардит

КЛЮЧОВІ СЛОВА

- ✓ після хвороби на гостру респіраторну інфекцію
- ✓ фебрильна температура тіла, розширення меж серця вліво
- ✓ ЧСС - 142/хв., парні передсердні екстрасистоли, глухість серцевих тонів

Правильна відповідь

Міокардит