

13. Чоловік віком 52 роки звернувся зі скаргами на періодичні болі за грудиною, порушення проходження твердої їжі, схуднення на 5 кг за 3 тижні. Під час фіброезофагогастроскопії виявлено: вільна прохідність стравоходу до рівня 37,5-38 см від краю верхніх різців, де визначається верхній полюс екзофітного утворення, що звужує просвіт до 1/2 від норми. За результатами біопсії: аденокарцинома. Яке передракове захворювання найімовірніше у пацієнта?

Відповідь

- a. Стравохід Баррета
- b. Дивертикул стравоходу
- c. Ліпома стравоходу
- d. Поліп стравоходу
- e. Стан після опіку стравоходу

Правильна відповідь: Стравохід Баррета

14. Хворий 42 роки, скаржиться на серцебиття, постійну слабкість, болі в ділянці серця, що іррадіюють в ліве плече, підсилюються при диханні, полегшуються, коли хворий сідає, підвищення температури тіла до 38,5⁰. АТ - 105/50 мм рт.ст., пульс - 120/хв. У зоні абсолютної тупості серця вислуховується двофазний шум. В легенях дихання послаблене в нижніх відділах. На ЕКГ - конкордантний підйом у відведеннях V2-V6. Який найбільш імовірний діагноз?

- 1. Перикардит*
- 2. Інфарк легень
- 3. Інфаркт міокарда
- 4. Пневмонія
- 5. Синдром Дреслера

Правильна відповідь: Перикардит

15. Чоловік віком 49 років скаржиться на напади стенокардії, що виникають під час ходьби на відстань до 500 м. З анамнезу відомо, що він багато років хворіє на хронічний бронхіт. Під час обстеження виявлено: в легенях невелика кількість сухих розсіяних хрипів, ЧД - 18/хв. Межі серця розширені вліво, тони приглушені, ЧСС=ПС=86/хв., АТ - 160/100 мм рт. ст. У клінічному аналізі крові виявлено: Нб - 160 г/л, лейкоцити - 6,4 тис., ШОЕ - 7 мм/год. На ЕКГ спостерігається гіпертрофія лівого шлуночка. Застосування якої групи ліків протипоказане з урахуванням супутньої патології у пацієнта?

Відповідь

- a.Пролонговані нітрати
- b.Антиагреганти
- c.Антагоністи кальцію
- d.Ангіопротектори
- e.Бета-блокатори

Правильна відповідь: Бета-блокатори

16. Пацієнт віком 20 років скаржиться на запаморочення, біль у серці, втому. Об'єктивно спостерігається: м'язи верхньої половини тіла гіпертрофовані при відносній гіпотрофії м'язів таза та нижніх кінцівок, вислуховується систолічний шум уздовж лівого краю груднини, АТ на руках - 180/90 мм рт. ст., АТ на ногах - 130/85 мм рт. ст. На ЕКГ виявлено ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Який найімовірніший діагноз?

- a.Мітральний стеноз
- b.Недостатність тристулкового клапана
- c.Дефект міжшлуночкової перетинки
- d.Коарктація аорти
- e.Недостатність аортального клапана

Правильна відповідь: Коарктація аорти