

Гостра дихальна недостатність

У хворого 67-ми років на 6-й день після планової операції раптово виникла гостра дихальна недостатність. Частота серцевих скорочень - 130/хв. Верхня половина тулуба, шия та обличчя ціанотичні, кашель, різкий біль за грудниною. Артеріальний тиск 90/60 мм рт.ст., центральний венозний тиск 330 мм вод.ст. На ЕКГ інверсія зубця Т. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

Варіанти відповідей:

- А. Тромбоемболія легеневої артерії
- В. Повторна кровотеча
- С. Гостра недостатність коронарних артерій
- Д. Гострий інфаркт міокарда
- Е. Гіповолемічний шок

Ключові слова

Після операції раптово виникла гостра дихальна недостатність
центральний венозний тиск 330 мм вод.ст. На ЕКГ інверсія зубця Т

Правильна відповідь:

A. Тромбоемболія легеневої артерії

Хвора 73-х років надійшла в клініку в екстреному порядку із защемленою стегноюю килою. Крім того у хворої наявна варикозна хвороба лівої нижньої кінцівки, ожиріння IV ст. Яке найбільш імовірне ускладнення може виникнути у післяопераційному періоді:

Варіанти відповідей:

А. Тромбоемболія легеневої артерії

В. Сепсис

С. Гостра дихальна недостатність

Д. Інфаркт міокарда

Е. Гостра пневмонія

Ключові слова

в екстренному порядку із зацеменою стегноюю килою, наявна варикозна хвороба

Правильна відповідь:

A. Тромбоемболія легеневої артерії

Пацієнту 30 років з позалікарняною пневмонією був призначений ампіцилін. Після другої ін'єкції хворий покритися холодним потом, з'явилась задишка і через хвилину пацієнт знепритомнів. При цьому артеріальний тиск 60/40 мм рт.ст., пульс-130 уд. за хвилину, слабкого наповнення, тони серця ослаблені. Яке ускладнення виникло у хворого:

Варіанти відповідей:

А. Медикаментозний анафілактичний шок

В. Гостра дихальна недостатність

С. Непритомний стан

Д. Інфекційно-токсичний шок

Е. Тромбоемболія легеневої артерії

Ключові слова

Після другої ін'єкції хворий покритися холодним потом, з'явилась задишка і через хвилину пацієнт знепритомнів.

артеріальний тиск 60/40 мм рт.ст., пульс-130 уд

Правильна відповідь:

A. Медикаментозний анафілактичний шок

Хворий 42 років лікується в відділенні інтенсивної терапії з приводу синдрому тривалого здавлення, гострої ниркової недостатності. При лабораторному обстеженні: сечовина 28,4 ммоль/л; креатинін 820 мкмоль/л; К 7,4 ммоль/л; Нв - 76 г/л; гематокрит 26\%; ер. $2,4 \times 10^{12}$ /л. Яке ускладнення може безпосередньо загрожувати життю хворого?

Варіанти відповідей:

- A. Гіперкаліємічна зупинка серця
- B. ДВЗ-синдром
- C. Гемічна гіпоксія
- D. Респіраторний дистрес-синдром
- E. Анемія

Ключові слова

терапії з приводу синдрому тривалого здавлення, гострої ниркової недостатності
креатинін 820 мкмоль/л; К 7,4 ммоль/л;

Правильна відповідь:

A. Гіперкаліємічна зупинка серця

У хворого 46-ти років з гострим абсцесом лівої легені при кашлі раптово виникли сильний біль у грудній клітці та задуха, посилилась тахікардія. На контрольній Ro-грамі виявлено колабовану ліву легеню, повітря в лівій плевральній порожнині з горизонтальним рівнем рідини. Який механізм виникнення даного ускладнення:

Варіанти відповідей:

- A. Розрив булли лівої легені
- B. Перехід запалення на вісцеральну плевру
- C. Ателектаз лівої легені
- D. Прорив гнійника в плевральну порожнину
- E. Гостра серцево-легенева недостатність

Ключові слова

з гострим абсцесом

при кашлі раптово виникли сильний біль у грудній клітці та задуха

Ро-грамі виявлено колабовану ліву легеню

повітря в лівій плевральній порожнині з горизонтальним рівнем рідини.

Правильна відповідь:

D. Прорив гнійника в плевральну порожнину

У пацієнта віком 78 років з хронічною венозною недостатністю раптово з'явилася задишка, <<кинджальний>> біль в грудній клітині, сухий кашель, серцебиття, температура тіла - $37,1^{\circ}\text{C}$, короткочасна непритомність. Під час обстеження виявлено: стан важкий, дифузний ціаноз, розширення яремних вен, ЧД - 35/хв, везикулярне дихання, акцент II тону над легеневою артерією, ЧСС - 130/хв, АТ - 80/60 мм рт. ст., сатурація знижена. Рівень D-димеру високий. ЕКГ: синусова тахікардія, P-pulmonale, негативний T в III та в V1-V2. Ro-ОГК: високе стояння куполу діафрагми ліворуч. Який стан ймовіріше розвився у пацієнта?

Варіанти відповідей:

- a. Напад бронхіальної астми
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Гостра дихальна недостатність
- d. Гострий коронарний синдром
- e. Гостра пневмонія

Ключові слова

<<кинджальний>> біль в грудній клітині

Рівень D-димеру високий

P-pulmonale, негативний T в III та в V1-V2.

Ro-ОГК: високе стояння куполу діафрагми ліворуч

Правильна відповідь:

в.Тромбоемболія легеневої артерії

У пацієнтки віком 60 років на третій день після венектомії у зв'язку з тромбофлебітом підшкірних вен раптово з'явилася задишка. Шкіра спочатку стала різко ціанотичною, а потім попелястого кольору. Спостерігається виражене психомоторне збудження, тахіпное, загруднинний біль. Яке ускладнення післяопераційного періоду виникло в пацієнтки?

Варіанти відповідей:

A. Кровотеча

B. Гіпостатична пневмонія

C. Тромбоемболія легеневої артерії

D. Клапанний пневмоторакс

E. Інфаркт міокарда

Ключові слова

у зв'язку з тромбофлебітом підшкірних вен раптово з'явилася задишка.

тахіпное, загруднинний біль

Правильна відповідь:

С. Тромбоемболія легеневої артерії

У жінки віком 68 років тиждень тому раптово з'явилися біль у лівій половині грудної клітки та задишка. Об'єктивно спостерігається: ціаноз, набряк шийних вен, пульс - 100/хв., АТ - 110/70 мм рт. ст., ЧД - 28/хв., печінка +4 см, ліва гомілка набрякла та різко болюча під час пальпації. Аускультативно виявлено: у легенях зліва, нижче лопатки, спостерігається притуплення легеневого звуку, наявні звучні вологі дрібнопухирцеві хрипи, межі серця розширені справа, акцент II тону над легеневою артерією. На ЕКГ виявлено глибокі зубці S у відведеннях I, aVL та Q у відведеннях III, aVF, негативний зубець T у відведеннях III, aVF. Який діагноз найімовірніший?

Варіанти відповідей:

- A. Крупозна пневмонія
- B. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
- C. Перикардит
- D. Плеврит
- E. Інфаркт міокарда

Ключові слова

раптово з'явилися біль у лівій половині грудної клітки та задишка

На ЕКГ виявлено глибокі зубці S у відведеннях I, aVL та Q у відведеннях III, aVF, негативний зубець T у відведеннях III, aVF.

Правильна відповідь:

В. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

Чоловік 68 років, що перебуває в реанімаційному відділенні з діагнозом: гострий інфаркт міокарда, раптово втратив свідомість. Об'єктивно пульс та АТ не визначаються. На ЕКГ спостерігаються часті нерегулярні хвилі різної форми та амплітуди. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

Варіанти відповідей:

- a. Гостра серцева недостатність
- b. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- c. Фібриляція шлуночків
- d. Асистолія
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

Ключові слова

На ЕКГ спостерігаються часті нерегулярні хвилі різної форми та амплітуди

Правильна відповідь:

с.Фібриляція шлуночків