

У пацієнтки віком 18 років після укусу бджоли спостерігається: набряк губи, обличчя, шиї, відчуття жару та задишка. Дихання утруднене, шумне, кашель. Шкіра бліда, холодна на дотик. АТ - 75/50 мм рт. ст. Пульс ниткоподібний - 98/хв. Тахікардія, тони серця глухі, ритмічні. Який найімовірніший діагноз?

Питання 134Відповідь

- a. Астматичний статус
- b. Гіпотонічний криз
- c. Анафілактичний шок
- d. Кропив'янка
- e. Набряк Квінке

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

У потерпілого опікова травма 15% поверхні тіла II-III ступеня. На 20-ту добу після травми у хворого спостерігається різке підвищення температури тіла, загальна слабкість, прискорене везикулярне дихання, загострення рис обличчя, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., пульс - 112/хв. Яке ускладнення можна припустити?

- a. Анаеробна інфекція
- b. Гостра інтоксикація
- c. Сепсис
- d. Гнійний бронхіт
- e. Пневмонія

Коментар

Правильна відповідь: Сепсис

Пацієнт віком 19 років скаржиться на утруднене дихання, явища риніту та набряк повік. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися на 7-й день після початку лікування пневмонії, має поліноз. Об'єктивно спостерігається: почервоніння та набряк повік, набряк м'якого піднебіння, язичка та піднебінних мигдаликів. Аускультативно в легенях вислуховується: поодинокі дрібноміхурцеві вологі хрипи. Який найімовірніший діагноз?

- a. Набряк Квінке
- b. Багатоформна ексудативна еритема
- c. Загострення полінозу
- d. Бронхіальна астма
- e. Алергічний кон'юнктивіт

Пацієнт віком 40 років був прооперований із приводу флегмони поперекової ділянки. Після операції у нього різко підвищилася температура тіла до 38^oC, з'явилися явища інтоксикації, зросла кількість лейкоцитів у крові. У післяопераційній рані, на місці

некротичної тканини, з'явилися бліді грануляції, заповнені гнійним умістом. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Сепсис
- b. Алергічна реакція
- c. Повторна флегмона
- d. Бешихове запалення
- e. Гнилісна флегмона

Коментар

Правильна відповідь: Сепсис

У хворого 47-ми років на восьмий день після операції з приводу панкреонекрозу, перитоніту з'явилося підвищення температури тіла до 39°C, анемія, лейкоцитоз, гіпопротейнемія, спленомегалія, токсична енцефалопатія. Яке ускладнення має розвиток у цій ситуації?

- a. Загальна гнійна інфекція (сепсис)
- b. Внутрішньоочеревинна кровотеча
- c. Гостра печінкова недостатність
- d. Гострий менінгіт
- e. Гостра ниркова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Загальна гнійна інфекція (сепсис)

Чоловік 31-го року доставлений до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на утруднене дихання, відчуття стороннього тіла в горлі, осиплість, сильний набряк обличчя та шиї. Вищевказані симптоми швидко нарастають та з'явилися протягом декількох хвилин після куштування меду. Який стан найбільш імовірно розвинувся у хворого?

- a. Запальний набряк гортані
- b. Ангіоневротичний набряк Квінке
- c. Гострий ларинготрахеїт
- d. Синдром Стівенса-Джонсона
- e. Токсичний епідермальний некроліз

Коментар

Правильна відповідь: Ангіоневротичний набряк Квінке

До опікового відділення доставлено потерпілого чоловіка 28 років зі циркулярними опіками тулуба та нижніх кінцівок. Визначте розмір опікової поверхні у потерпілого:

- a. 30%
- b. 72%

c.36%

d.45%

e.20%

Коментар

Правильна відповідь: 72%

У хворого 24-х років, який перебував на лікуванні з приводу менінгококцемії, погіршився загальний стан. Об'єктивно: акроціаноз, кінцівки холодні, ЧД- 30/хв., ЧСС- 140/хв., АТ- 40/0 мм рт.ст., анурія. Який невідкладний стан розвинувся?

a.Септичний шок

b.Гіповолемічний шок

c.Тромбоз легеневої артерії

d.Гемолітико-уремічний синдром

e.Анафілактичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Септичний шок