

Пацієнт віком 35 років скаржиться на носові кровотечі, кровоточивість ясен, сонливість, запаморочення. Із анамнезу відомо, що хворіє на цироз печінки впродовж 6 років, зловживає алкоголем. Об'єктивно спостерігається: неприємний солодкуватий запах із рота, асцит, жовтяниця, атаксія, гіперрефлексія. Печінка не пальпується. За результатами лабораторних досліджень виявлено: білірубін - 150 мкмоль/л, АлАТ - 2,0 ммоль/л, АсАТ - 1,2 ммоль/л, тромбоцити - $130 \cdot 10^9$ /л, протромбіновий індекс - 52%. Яке ускладнення розвинулося в пацієнта?

- a. Кровотеча з варикозно-розширених вен стравоходу
- b. Рак печінки
- c. Тромбоз ворітної вени
- d. Уремична кома
- e. Печінкова недостатність*

У чоловіка 55-ти років 2 роки тому верифіковано цироз печінки. Впродовж 2-х тижнів стан погіршився, з'явилися сонливість, запаморочення, втрата орієнтації у просторі і часі. Напередодні відзначав день народження в ресторані. Який синдром зумовив погіршення стану хворого?

- a. Печінкової енцефалопатії*
- b. Холестазу
- c. Жовтяниці
- d. Гіперспленізму
- e. Цитолізу

Дівчина 17-ти років хворіє на цироз печінки впродовж 3-х років. Останніми днями у дівчини періоди збудження змінюються депресією, спить мало. Об'єктивно: стан тяжкий, дівчина загальмована, говорить поодинокі слова, тремор кінцівок, шкірні покриви іктеричні, на шкірі поодинокий геморагічний висип. Найімовірніше ускладнення хвороби:

- a. Сепсис
- b. Синдром Рея
- c. Біполярний афективний розлад
- d. Ниркова недостатність

е.Печінкова енцефалопатія*

Пацієнтку віком 48 років шпиталізовано до лікарні з неадекватною поведінкою. Із анамнезу відомо, що постійно вживала знеболюючі препарати у зв'язку з мігренню та болем у спині. Об'єктивно спостерігається: жовтяничність склер, чутливість у правому верхньому квадранті живота та астериксис. За результатами аналізу крові виявлено: АЛТ - 649 Од/л, загальний білірубін - 95,8 мкмоль/л, МНВ - 6,8. Який найімовірніший діагноз?

- а.Інтотоксикація протисудомними засобами
- б.Гостре порушення мозкового кровообігу
- с.Гостра печінкова недостатність*
- д.Гостра ниркова недостатність
- е.Гостра наднирникова недостатність

Хворий 51-го року скаржиться на блювання з домішками крові. Зловживав алкоголем. Хворіє з 40-ка років, коли вперше виникла жовтяниця. При огляді: шкіра та видимі слизові оболонки жовтушні, "судинні зірочки". Зниженого живлення. Живіт збільшений в об'ємі, пупкова грижа, асцит. Край печінки гострий, неболючий, +3 см, селезінка +2 см. Аналіз крові: Нв - 80 г/л, лейкоцити - $3 \cdot 10^9$ /л, тромбоцити - $85 \cdot 10^9$ /л. Причиною портальної гіпертензії у хворого є:

- а.Констриктивний перикардит
- б.Синдром Бадда-Кіарі
- с.Цироз печінки на тлі зловживання алкоголю*
- д.Тромбоз вени селезінки
- е.Гемохроматоз

Чоловіка 48-ми років доставлено до лікаря у непритомному стані. В анамнезі зловживання алкоголем. При обстеженні шкіра бліда, на тулубі "судинні зірочки", печінковий запах з рота, язик обкладений коричневим нальотом. Підшкірні вени передньої стінки живота розширені у вигляді (caput medusae). При пальпації органів черевної порожнини позитивний симптом флюктуації, гепатомегалія, спленомегалія. Набряки нижніх кінцівок. Який стан у хворого є найбільш імовірним?

- a. Перфоративна виразка шлунка
- b. Гостра шлунково-кишкова кровотеча
- c. Гостра печінкова недостатність*
- d. Гіперглікемічна кома
- e. Гіпоглікемічна кома

Чоловік 56 років протягом тривалого часу страждає на цироз печінки з ознаками портальної гіпертензії. Відмічалися явища кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу. Під впливом терапії кровотечу було зупинено. Який із препаратів найбільш доцільно призначити для профілактики цього ускладнення?

- a. Пропранолол*
- b. Гепарін
- c. Вазопресин
- d. Контрикал
- e. Препарати заліза

Пацієнт з діагнозом цироз печінки та портальна гіпертензія скаржиться на виражену втому, погіршення когнітивних функцій, безсоння. Яке ускладнення найбільш імовірно виникло у цього пацієнта?

- a. Печінкова кома
- b. Печінкова енцефалопатія*
- c. Геморагічний шок
- d. Гострий панкреатит
- e. Вірусний гепатит

Пацієнт 54 років з цирозом печінки поступає з симптомами печінкової енцефалопатії, включаючи сплутаність свідомості та дезорієнтацію. Лабораторний аналіз показує підвищений рівень аміаку. Який препарат є оптимальним для зниження рівня аміаку в крові?

- a. Октреотид
- b. Лактулоза*

- c. Спіронолактон
- d. Рифаксимін
- e. Пропранолол

Пацієнт 60 років з діагностованим цирозом печінки та варикозним розширенням вен стравоходу поступає з епізодом сильної шлунково-кишкової кровотечі. Що з перерахованого є найкращим препаратом для зниження портального тиску та зупинки кровотечі?

- a. Лактулоза
- b. Октреотид*
- c. Фуросемід
- d. Левотироксин
- e. Спіронолактон