

Тема: Ведення хворого з легеневим інфільтратом



Пацієнт віком 19 років скаржиться на сухий кашель, біль в м'язах, підвищення температури тіла до 39°C . Протягом тижня спостерігалися біль в горлі, субфебрилітет. Об'єктивно виявлено жорстке дихання. Під час загального аналізу крові виявлено: лейкоцити - $10,0 \cdot 10^9/\text{л}$, лейкоцитарний зсув вліво, ШОЕ - 26 мм/год. В ході рентгенографії ОГП спостерігається підсилення легеневого малюнку, малоінтенсивні вогнищеві тіні в нижніх відділах правої легені. Які лікарські засоби найдоцільніше призначити?

Варіанти відповідей

- A. Цефалоспорины II або III покоління
 - B. Макроліди
 - C. Сульфаніламідиди
 - D. Антибіотики пеніцилінового ряду
 - E. Аміноглікозидиди
- 

КЛЮЧОВІ СЛОВА

температури тіла до 39^oC

підсилення легеневого малюнку

малоінтенсивні вогнищеві тіні в нижніх

відділах правої легені

Правильна відповідь

Антибіотики пеніцилінового ряду



Пацієнт віком 47 років, захворів 3 дні тому. Скаржиться на підвищення температури до 39°C , продуктивний кашель з мокротинням жовто-зеленого кольору, задишку, біль у лівій половині грудної клітини. Під час обстеження виявлено: ЧД - 26/хв, укорочення перкуторного звуку та крепітація нижче кута лопатки зліва. SpO_2 в межах норми (96%). Який з наведених методів досліджень найбільш інформативний для встановлення остаточного діагнозу?

Варіанти відповідей


A. Спірографія

B. Бронхоскопія

C. Клінічний аналіз крові

D. Мікробіологічне дослідження мокротиння

E. Рентгенографія органів грудної клітки



КЛЮЧОВІ СЛОВА

продуктивний кашель з мокротинням жовто-зеленого

кольору

укорочення перкуторного звуку

крепітація нижче кута лопатки

Правильна відповідь

Рентгенографія органів грудної клітки



Чоловік віком 34 роки захворів 3 дні тому після переохолодження. Скаржиться на підвищення температури до $39,2^{\circ}\text{C}$, виражену загальну слабкість, пітливість, кашель. Кашель був спочатку сухий, протягом останньої доби з'явилася невелика кількість «іржавого» мокротиння. Під час об'єктивного обстеження спостерігається: герпес на губах, перкуторно над легеньми справа в нижніх відділах спостерігається притуплений звук. Аускультативно виявлені бронхіальне дихання, тахікардія. В органах черевної порожнини змін не виявлено. Який діагноз є найімовірнішим?

Варіанти відповідей

- A. Абсцес легені
 - B. Ексудативний плеврит
 - C. Негоспітальна вогнищева пневмонія
 - D. Нозокоміальна пневмонія
 - E. Крупозна пневмонія
- 

КЛЮЧОВІ СЛОВА

«іржаве» мокротиння

герпес на губах

в нижніх відділах спостерігається притуплений звук



Правильна відповідь

Крупозна пневмонія



Раніше здоровий хлопець 22-х років прийшов на прийом до лікаря зі скаргами на підвищену температуру та кашель з жовтим мокротинням, що продовжуються протягом 7-ми днів. При фізикальному обстеженні температура - $38,3^{\circ}\text{C}$, артеріальний тиск - 130/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 79/хв., частота дихання - 17/хв., SpO_2 - 95% при кімнатному повітрі. При аускультації звучні вологі хрипи зліва. На оглядовій рентгенограмі консолідація у нижній частці лівої легені. Який з перерахованих препаратів буде найбільш доцільно призначити цьому пацієнту?

Варіанти відповідей

A. Триметоприм-сульфаметоксазол

B. Левофлоксацин

C. Азитроміцин

D. Ципрофлоксацин

E. Гентаміцин

КЛЮЧОВІ СЛОВА

кашель з жовтим мокротинням

температура - 38,3[°]С

звучні вологі хрипи зліва

консолідація у нижній частці лівої легені

Правильна відповідь

Азитроміцин



Жінка 38 років скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, кашель зі скудним мокротинням, утруднення вдиху. Захворіла після переохолодження 2 доби тому. Рентгенологічне дослідження визначило локальне затемнення у нижній частці правої легені. У крові виявлено: лейкоцити - $14 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ - 44 мм/год, СРБ - 140 мг/л. Який найімовірніший діагноз?

Варіанти відповідей

A. Плеврит

B. Гострий бронхіт

C. Госпітальна пневмонія

D. Негоспітальна пневмонія

E. Бронхіальна астма

КЛЮЧОВІ СЛОВА

температури тіла $38,5^{\circ}\text{C}$

переохолодження 2 доби тому

локальне затемнення у нижній частці правої легені

Правильна відповідь

Негоспітальна пневмонія



**У хворого 37-ми років, ВІЛ-позитивного, впродовж 2-х тижнів
наростала задишка, температура підвищилась до 37,7^oC.
Діагностована пневмоцистна пневмонія. Який з препаратів
етіотропної терапії показаний у цьому випадку?**

Several white lines of varying lengths and thicknesses are drawn diagonally across the bottom right corner of the slide, pointing towards the bottom right.

Варіанти відповідей

A. Ко-тримоксазол

B. Ацикловір

C. Флуконазол

D. Цефтріаксон

E. Метронідазол



КЛЮЧОВІ СЛОВА
ВІЛ-позитивний
пневмоцистна пневмонія



Правильна відповідь

Ко-тримоксазол



Пацієнт 20-ти років звернувся в клініку із скаргами на загальну слабкість, підвищення температури тіла, припухлість та болючість суглобів, висипання на гомілках. На рентгенограмі ОГК збільшені внутрішньогрудні лімфатичні вузли. Найбільш імовірний діагноз:

Several white lines of varying lengths and angles are positioned in the bottom right corner of the slide, serving as a decorative element.

Варіанти відповідей

A. Саркоїдоз

B. Рак легень

C. Туберкульоз легень

D. Лімфогрануломатоз

E. Медіастиніт



КЛЮЧОВІ СЛОВА

підвищення температури тіла

припухлість та болючість суглобів

висипання на гомілках

збільшені внутрішньогрудні лімфатичні вузли



Правильна відповідь

Саркоїдоз



Чоловік 27 років скаржиться на сухий кашель, задишку під час найменшого навантаження, біль у грудній клітці, підвищення температури до 37,3^oC упродовж 3 тижнів. Колись зловживав наркотиками. Дихання жорстке, хрипів немає, тахікардія - 120/хв. Рентгенологічно з обох сторін легенів спостерігаються інтерстиціальні зміни. Під час бронхоскопії в лаважній рідині виявлені *Pneumocista carinii*. Які препарати будуть найефективнішими для лікування цього пацієнта?

Варіанти відповідей

- A. Інтерферон, ремантадин
- B. Еритроміцин, рифампіцин
- C. Бісептол, кліндаміцин
- D. Цефамізін, нітроксолін
- E. Ампіцилін, нізорал

КЛЮЧОВІ СЛОВА

підвищення температури до $37,3^{\circ}\text{C}$

зловживав наркотиками

інтерстиціальні зміни

в лаважній рідині виявлені *Pneumocista carinii*

Правильна відповідь

Бісептол, кліндаміцин



Чоловік віком 27 років скаржиться на кашель із виділенням гнійного харкотиння, біль у грудній клітці під час дихання, підвищення температури до 38,6 C⁰. Захворів гостро після переохолодження. Був госпіталізований до стаціонару. Після лабораторного та рентгенологічного дослідження йому діагностовано позагоспітальну пневмонію. З якого антибіотика найдоцільніше почати лікування?

Варіанти відповідей

- A. Гентаміцину сульфат
 - B. Ванкоміцин
 - C. Тетрацикліну гідрохлорид
 - D. Лінкоміцин
 - E. Амоксицилін клавуланат
- 
- Several thin, parallel white lines are drawn diagonally across the bottom right corner of the slide, extending from the middle of the right edge towards the bottom left.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

позагоспітальна пневмонія



Правильна відповідь

Амоксицилін клавуланат



Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 40°C, озноб, кашель із мокротинням, кровохаркання та біль у грудній клітці під час дихання, міалгію, діарею. З анамнезу відомо, що працює у фірмі обслуговування кондиціонерів. Декілька днів тому його колега звернувся до лікарні з такими самими скаргами. Під час рентгенографії ОГК виявлено: вогнищеві інфільтративні тіні різної форми і щільності в обох легенях. Який збудник найімовірніше викликав захворювання?

Варіанти відповідей

А. Мікоплазма

В. Пневмокок

С. Клебсієла

Д. Стафілокок

Е. Легіонела

КЛЮЧОВІ СЛОВА

кашель із мокротинням

кровохаркання та біль у грудній клітці

обслуговування кондиціонерів

**вогнищеві інфільтративні тіні різної форми і щільності в
обох легенях**



Правильна відповідь

Легіонела

