

Під час обстеження пацієнта виявлено такі симптоми: прогресуюча кволість, зниження працездатності, швидка фізична та психічна втомлюваність, відчуття мерзлякуватості та голоду, втрата маси тіла. Установіть вид аліментарного захворювання:

*а. Білково-енергетична недостатність

б. Недостатність харчових волокон

с. Недостатність поліненасичених жирних кислот

д. Мінеральна недостатність

е. Вітамінна недостатність

Чоловік 36-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на серцебиття, пітливість, схуднення на 5-6 кг за останні 3 місяці. Апетит збережений. При фізикальному обстеженні: артеріальний тиск - 130/60 мм рт.ст., пульс - 140/хв., шкіра волога, тепла. При пальпації рівномірне збільшення щитоподібної залози. Призначення якого дослідження буде найбільш доречним?

а. Загальний аналіз сечі

б. Рівень глюкози крові

с. Загальний аналіз крові

д. Рівень тропонінів у крові

*е. Рівень тиреотропних гормонів у крові

Пацієнт віком 53 роки скаржиться на слабкість, відсутність апетиту, схуднення та підвищення температури тіла. Об'єктивно спостерігається: лімфаденопатія, вузли тістуватої консистенції. Гепатомегалія. За результатами загального аналізу крові виявлено: еритроцити - $4,0 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 110 г/л, лейкоцити - $100 \cdot 10^9/л$, базофіли - 1%, еозинофіли - 1%, паличкоядерні - 1%, сегментоядерні - 22%, моноцити - 2%, лімфоцити - 73%, тині Боткіна-Гумпрехта. Який найімовірніший діагноз?

а. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

б. Лімфогранулематоз

*с. Гострий лімфобластний лейкоз

d.Хронічний мієлоїдний лейкоз

e.Мієломна хвороба

Дівчина 22 років, хвора на системний червоний вовчак, скаржиться на лихоманку, схуднення, біль у дрібних суглобах кистів. Об'єктивно встановлено: дифузна алопеція, генералізована лімфаденопатія, еритематозна висипка на щоках та спинці носа, ексудативний плеврит та перикардит. Температура тіла - $38,4^{\circ}\text{C}$. У крові виявлено: лейкоцити - $3,1 \cdot 10^9/\text{л}$, Нв - 102 г/л, ШОЕ - 56 мм/год, С-реактивний протеїн - (++++). Яка доза преднізолону є доцільною у цьому разі?

*a.1 мг/кг

b.0,5 мг/кг

c.0,1 мг/кг

d.0,25 мг/кг

e.0,75 мг/кг

Пацієнта віком 62 роки турбують постійний біль в епігастрії та схуднення на 12 кг. За даними фізикального та інструментального обстежень (фіброгастроскопія з біопсією, УЗД органів черевної порожнини, рентгенографія органів грудної клітки) у пацієнта виявлено рак тіла шлунка без ознак віддаленого метастазування. Висновок гістологічного дослідження: помірно диференційована аденокарцинома. Який адекватний обсяг оперативного втручання?

a.Дистальна субтотальна резекція шлунка

b.Проксимальна субтотальна резекція шлунка

*c.Гастректомія

d.Операція Льюїса

e.Обхідний гастроентероанастомоз

Пацієнтка віком 40 років скаржиться на слабкість та швидку втомлюваність. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися протягом року, близько місяця тому приєдналась важкість у лівому підребер'ї та пітливість, температура тіла підвищилася до $37,5^{\circ}\text{C}$, почала втрачати вагу. Об'єктивно спостерігається:

стан середньої важкості, блідість шкірних покривів з петехіальним висипом. Лімфатичні вузли не збільшені, легені та серце без особливостей. Гепатоспленомегалія, щільна та помірно болюча селезінка. За результатами аналізу крові виявлено: еритроцити - $3,0 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін - 110 г/л, КП - 1,1, лейкоцити - $50 \cdot 10^9/\text{л}$, базофіли - 3%, еозинофіли - 6%, мієлоцити - 10%, паличкоядерні - 19%, сегментоядерні - 17%, лімфоцити - 22%, тромбоцити - $105 \cdot 10^9/\text{л}$, бластні клітини - 23%, ШОЕ - 32 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий лімфобластний лейкоз
- b. Еритролейкоз
- *c. Хронічний мієлоїдний лейкоз
- d. Хронічний моноцитарний лейкоз
- e. Лімфогранулематоз

У хлопця 18 років скарги на переймоподібний біль у животі, рідкі випорожнення до 6 разів на добу з домішками слизу та свіжої крові. Хворіє впродовж року. Схуд на 10 кг. Об'єктивно встановлено: живіт м'який, болючий по ходу товстої кишки, особливо зліва. Сигмовидна кишка спазмована. У крові виявлено: еритроцити - $3,2 \cdot 10^{12}/\text{л}$, Hb - 92 г/л, лейкоцити - $10,6 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ - 34 мм/год. Іригоскопія показала: товста кишка звужена, гаустри відсутні, контури нечіткі, симптом <<водопровідної труби>>. Який найбільш ймовірний діагноз?

- a. Амебна дизентерія
- b. Хронічний ентероколіт
- c. Туберкульоз кишечника
- *d. Неспецифічний виразковий коліт
- e. Хвороба Крона

У 38-річної жінки після сварки виникло головокружіння, слабкість. В анамнезі вказані: анорексія, втрата ваги, нудота, діарея. Гіпотензія - 60/30 мм рт. ст. у вертикальному положенні. Пульс - 110/хв., малий, ритмічний. Глюкоза крові - 3,3 мм/л. Гіпонатріємія. Гіперкаліємія. Гіперпигментація

шкіри. Екскреція 17-КС та 17-ОКС із сечею знижені. Який попередній діагноз?

a.-

b.Прихована внутрішня кровотеча

*c.Наднирникова недостатність

d.Цукровий діабет, гіпоглікемічний стан

e.Вагітність, гіпотонічний стан

У хворої 65-ти років протягом 5 тижнів прогресує безбольова жовтяниця, шкірне свербіння, схудла на 10 кг, ахолія. Пальпується позитивний симптом Курвуазьє. Який попередній діагноз?

*a.Рак підшлункової залози

b.Рак печінки

c.Рак жовчного міхура

d.Вірусний гепатит

e.Малярія

Чоловік 65-ти років надійшов до стаціо-нару з приводу хірургічного лікування гострого некротичного панкреатиту. Оперативне втручання пройшло без ускладнень. На 5-й день після операції стан погіршився. При фізикальному обстеженні температура тіла підвищена до $38,5^{\circ}\text{C}$, артеріальний тиск - 110/65 мм рт.ст., пульс - 118/хв., частота дихання - 28/хв., SpO_2 - 92%. При аускультації легень звучні хрипи у правій нижній ділянці легень. Післяопераційна рана загоюється добре, живіт при пальпації безболісний, ненапружений. Який діагноз є найбільш імовірним?

a.-

b.Злоякісна гіпертермія

c.Синдром системної запальної відповіді неінфекційної природи

d.Медикаментозна лихоманка

*e.Сепсис

Пацієнт віком 40 років звернувся до лікаря зі скаргами на відчуття важкості та розпирання в епігастральній ділянці після прийому їжі, блювання 1 раз на

2-3 дні залишками їжі, вживаною напередодні, втрату маси тіла - близько 10 кг за останні 2 місяці. Із анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на виразкову хворобу шлунка протягом 5 років. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло в пацієнта?

a. Пенетрація

b. Дуоденогастральний рефлюкс

c. Діафрагмальна грижа

*d. Стеноз воротаря шлунку

e. Перфорація