

«ЗАТВЕРДЖУЮ»  
Медичний директор ОКНП «Чернівецька  
лікарня швидкої медичної допомоги»

  
\_\_\_\_\_  
« 25 » 03 2024 р.

I.I. Ілашук

### АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

- Назва впровадження** «Спосіб профілактики розвитку гепатотоксичних реакцій у хворих на множинну мієлому із супутнім ожирінням»
- Ким запроваджено, адреса, виконавці** кафедра внутрішньої медицини №1 Полтавський державний медичний університет 36011, Полтава, вул. Шевченка, 23 д.мед.н., проф. Скрипник І.М., д.мед.н., доц. Маслова Г.С., Скрипник Р.І.
- Джерело інформації:**  
Скрипник І.М. Вплив L-орнітину-L-аспартату на вияви мінімальної печінкової енцефалопатії в динаміці цитостатичної терапії / І.М. Скрипник, Г.С. Маслова, Р.І. Скрипник // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 6. – С. 29-34.
- Де і коли впроваджено (назва лікувального закладу)**  
Гематологічне відділення ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»  
Дата початку впровадження 24.02.2022  
Загальна кількість спостережень 17
- Результати застосування методу за період з 24.02.2022 р. по 30.11.2023 р.**  
Позитивні (к-ть спостережень) 17  
Не визначені \_\_\_\_\_  
Негативні \_\_\_\_\_
- Ефективність впровадження:** хворим на множинну мієлому на фоні хіміотерапії призначення L-орнітину-L-аспартату (Гепе-Мерц) перорально у дозі 15 мг/день у три прийоми, розчинивши вміст пакету в 200 мл води, ефективно усуває прояви мінімальної печінкової енцефалопатії і виявляє протективну дію на гепатоцити, забезпечуючи відсутність зростання активності печінкових ферментів щитолізу та холестазу і рівня білірубіну
- Зауваження, пропозиції:** рекомендовано продовжити використання даного способу профілактики розвитку гепатотоксичних реакцій у хворих на множинну мієлому із супутнім ожирінням у клінічній практиці.

Відповідальний за впровадження

Завідувач гематологічного відділення



В.В. Тимофєєв