

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня»

В.В. Горох

2022

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

1. Назва впровадження «Спосіб профілактики розвитку гепатотоксичних реакцій у хворих на множинну мієлому із супутнім ожирінням»

2. Ким запроваджено, адреса, виконавці кафедра внутрішньої медицини №1 Полтавський державний медичний університет 36011, Полтава, вул. Шевченка, 23 д.мед.н., проф. Скрипник І.М., д.мед.н., доц. Маслова Г.С., Скрипник Р.І.

3. Джерело інформації:

Скрипник І.М. Вплив L-орнітину-L-аспартату на вияви мінімальної печінкової енцефалопатії в динаміці цитостатичної терапії / І.М. Скрипник, Г.С. Маслова, Р.І. Скрипник // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 6. – С. 29-34.

4. Де і коли впроваджено (назва лікувального закладу)

Гематологічне відділення КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня»

Дата початку впровадження 10.12.2020.

Загальна кількість спостережень 16

5. Результати застосування методу за період з 10.12.2020. по 30.10.2022.

Позитивні (к-ть спостережень) 16

Не визначені

Негативні

6. Ефективність впровадження: хворим на множинну мієлому на фоні хіміотерапії призначення L-орнітину-L-аспартату (Гепі-Мерц) перорально у дозі 15 мг/день у три прийоми, розчинивши вміст пакету в 200 мл води, ефективно усуває прояви мінімальної печінкової енцефалопатії і виявляє протективну дію на гепатоцити, забезпечуючи відсутність зростання активності печінкових ферментів цитолізу та холестазу і рівня білірубину.

7. Зауваження, пропозиції.

Відповідальний за впровадження
Завідувач гематологічним відділенням



П.Й. Придюк